


ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ КОРОТКОЙ КИШКИ (СКК) У ДЕТЕЙ И ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ О СВОЕМ ДИАГНОЗЕ?

ЧТО ТАКОЕ СКК?

Это состояние, возникающее при удалении значительной части тонкой кишки, вследствие чего нарушается способность кишечника к перевариванию еды и всасыванию питательных веществ.



КАК ЛЕЧАТ СКК У ДЕТЕЙ?¹



ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

- соблюдение специальной диеты и прием пищевых добавок;
- парентеральное питание (ПП) (введение питательных веществ по катетеру в вену);
- энтеральное питание через желудочный или кишечный зонд.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- патогенетическая терапия, направленная на увеличение всасывающей поверхности кишечника (аналоги ГПП-2);
- терапия сопутствующих состояний (спазмолитики, антибиотики и т.д.)



ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДЛИНЕНИЮ КИШКИ

СКК — синдром короткой кишки.
ПП — парентеральное питание.
ГПП-2 — глюкагоноподобный пептид 2.

1. Адаптировано из проекта клинических рекомендаций по синдрому короткой кишки от 2022 года. Доступно по ссылке https://www.gastro.ru/userfiles/R_СиндрКорКиш%20ПРОЕКТ.pdf дата доступа 07.10.24



ДИАГНОЗ СКК¹: ВОЗМОЖНО ЛИ СОХРАНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?



Если сохранившейся длины кишечника недостаточно для адекватного восполнения питательных веществ, то Вам может быть необходимо длительное парентеральное питание (ПП) вплоть до пожизненного.

Длительное ПП — это навсегда? Или возможно вернуться к привычному образу жизни?

При помощи патогенетической терапии Вы можете снизить объем потребляемого парентерального питания Вашим пациентом, вплоть до полного отказа от него в некоторых случаях. Это значит, что пациент может вернуться к полноценному приему пищи и забыть про капельницы.

СКК — синдром короткой кишки.
СКК-КН — синдром короткой кишки с кишечной недостаточностью.
ПП — парентеральное питание.

1. Адаптировано из проекта клинических рекомендаций по синдрому короткой кишки от 2022 года. Доступно по ссылке https://www.gastro.ru/userfiles/R_СиндрКорКиш%20ПРОЕКТ.pdf дата доступа 07.10.24.

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, КОТОРЫЕ СМОГЛИ СНИЗИТЬ ОБЪЕМ ПП НА $\geq 20\%$ ² НА ФОНЕ ПРИЕМА ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

2
70%

пациентов с СКК-КН через 6 месяцев терапии

2
93%

пациентов через 30 месяцев

2. Ramos Boluda E, Redecillas Ferreiro S, Manrique Moral O, García Romero R, Irastorza Terradillos I, Nuñez Ramos R, Germán Díaz M, Polo Miquel B, Vives Piñera I, Alcolea Sánchez A, González Sacristán R, Bautista Barea M, Moreno Villares JM. Experience With Teduglutide in Pediatric Short Bowel Syndrome: First Real-life Data. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Dec;71(6):734-739. doi: 10.1097/MPG.0000000000002899. PMID: 32804906

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НА ПУТИ ПАЦИЕНТА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С СКК



СКК — синдром короткой кишки.
ТМК — телемедицинская консультация.

* Если сохранившейся длины кишечника недостаточно для адекватного восполнения питательных веществ.

ПАЦИЕНТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И **БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ,** КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ



Пациентская
организация
«Ветер Надежд»

+7 (985) 533-02-90

Биркая Евгения Алексеевна,
генеральный директор
ПО «Ветер Надежд»

 skk-vn.ru
pacient@skk-vn.ru

 <https://skk-vn.ru/>
Для взрослых и детей



С ЧЕМ ПОМОЖЕТ ПАЦИЕНТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?

- Преодоление сложностей в постановке диагноза и получение лекарственного обеспечения
- Юридическая поддержка на всех этапах
- Получение знаний о жизни с заболеванием
- Психологическая поддержка
- Взаимопомощь между пациентами
- И многое другое...

БЕСПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ



Транспортная программа

8-800-775-26-78



Узнайте об обеспечении транспортной поддержки пациентов с СКК-КН в профильные медицинские организации



Цифровые инструменты для поиска профильных центров и специализированной помощи в Вашем регионе:



Чат-бот
«Навигатор СКК»



Портал поддержки
«е-Компас»

Размещенная информация не является рекомендацией компании Такеда, рекламой компании или ее продукции, не должна быть основанием для принятия каких-либо решений или осуществления каких-либо действий, не является призывом к самолечению или заменой рекомендации лечащего врача. Данная информация ни при каких условиях не должна использоваться для постановки диагноза и выбора метода лечения, во всех случаях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и ознакомиться с противопоказаниями перед применением любых назначенных лекарственных препаратов.

ООО «Такеда Фармасьютикалс»
ул. Усачева, дом 2, стр. 1, 119048, г. Москва, Россия
Тел: +7 (800) 700-55-11, факс: +7 (495) 502-16-25
www.takeda.com/ru-ru/
VV-MEDMAT-97920, декабрь 2024

